

原 著

Overtreatment Dermatitis and Overtreatment Hair-breakdown

山本 幸代*・須貝 哲郎*

Sachiyo YAMAMOTO and Tetsuro SUGAI*

Abstract

Two female patients with irritated contact dermatitis on the face, and a male patient with diffuse alopecia following overtreatment are reported. The case 1 is a 25-year-old woman who has washed her face with soap five times daily and carried out a facial packing every evening these 12 months. The case 2 is a 52-year-old woman who has done strong brushings on her face several times daily to remove pigmented macules. The case 3 is a 46-year-old man who has had a cold wave process at 60°C monthly. Two weeks after the third process, a severe hair-breakdown is seen on the scalp, especially on the occipital region, resulting in diffuse alopecia.

要 約

過剰手入れないし誤った手入れにより発症した25才および52才女性の顔面刺激性皮膚炎2例と46才、男性の毛髪断裂による脱毛症について述べる。

症例1は尋常性痤瘡に対し、1日5回の石けん洗顔、毎就寝前のパックとマッサージを励行し、約2週後より刺激性皮膚炎を発症。症例2は1日5～6回ナイロンブラシで顔面をマッサージして発症。症例3は約60℃加温でパーマネットウエーブを毎月1回かけていたところ、3回目施行2週間後に後頭部の脱毛を生じた。

症 例

症例1：25才、女。

初診は昭和54年9月12日。約1年前より皮膚乾燥化を来し、掻痒性皮疹を繰返すために来院。初診時、顔頸部は乾燥著明、落屑が目立ち、紅斑状で少数の紅色丘疹と膿疱を混じり毛細血管拡張が散在性にみられた。(Fig. 1)。

尋常性痤瘡および接触皮膚炎と診断。一般臨床検査成績に異常なく、持参化粧品、当科常備の化粧品アレルゲン、日常生活用品アレルゲンなどによるパッチテストもすべて陰性であった。そこで再問診したところ、